

# 疥瘡處理作業標準

- 1、感染疥瘡時，因傳染性高，須全家一起治療。
- 2、疥蟲離開皮膚約一週即全部死亡，家中衣物及床單用塑膠袋包密靜置兩星期，或以熱水 100°C 以上煮沸十分鐘，床墊可在陽光下曬 48 小時以上。
- 3、與患者接觸時，需戴上手套，穿隔離衣，接觸後徹底洗手，並將隔離衣包裹裝入感染塑膠袋內。
- 4、盡量減少與疥瘡患者使用同一衛浴設備，個人衛生用品勿共用。
- 5、維持個人清潔衛生習慣及環境整潔。
- 6、疥瘡感染治療後，皮膚搔癢可能繼續存在約一個月，可請醫師開止癢藥物服用。

## 病患之衣物處理

1. 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等須與其他家人或院友的分隔清洗。
2. 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等須用熱水（攝氏六十度或以上，時間不少於十分鐘）來消滅疥蟲及其卵子。若不可行，可改用焗（時間不少於三十分鐘）的方法或用電熱燙斗燙之。
3. 難以清洗的衣物和被褥，如鞋、棉被等，可放入膠袋後封密，擱置最少十四日後，便能正常使用。

## 藥物治療

疥瘡的藥物治療，包括外用殺疥藥（疥瘡乳劑）及止癢藥。

## 疥瘡乳劑 (Benzyl Benzoate) 之用法

1. 晚上沐浴後，抹乾全身，最好在他人協助下，用排筆將乳劑由頸部開始，塗遍全身（手指縫及腳趾縫均須塗上乳劑，頭部除外），然後穿回衣服。
2. 次日早上，重覆塗乳劑一次，但無須沐浴，然後穿回衣服。
3. 次日晚上，用熱水及肥皂沐浴後，換上清潔之衣服及被鋪。
4. 在兩次塗抹乳劑中間的時間，不須更換衣服及床鋪。
5. 乳劑只適宜用兩次，過多使用，會刺激皮膚引起不適。由於乳劑會被水份洗去，所以洗手後須重新塗乳劑於雙手。6. 治療起初的一至兩星期，病者可能間中有痕癢，這並不表示治療失效；但如果病徵持續多過兩星期或皮膚出現其他變化，應立即請教醫生。